

Es importante la correcta vacunación de los perros, cachorros y adultos contra las enfermedades más comunes: Parvovirus, Moquillo, Hepatitis, Leptospirosis, Rabia, Tos de las Perreras, enfermedad de Lyme, Coronavirus, etc. Existen un sinnúmero de enfermedades contra las que podemos realizar una vacunación de los perros; el tipo de vacuna y pauta de la vacunación debe aconsejarla su veterinario, dado que dependerá de:

- **Edad y raza del perro.** Si el cachorro se ha destetado tempranamente, deberá vacunarse a las 6 semanas contra la Parvovirus, pero si tiene más de 2 meses, se le puede inmunizar contra un mayor número de enfermedades en la misma vacunación. Las enfermedades de mayor riesgo para los cachorros jóvenes son el Moquillo y la Parvovirus, y son las primeras que deben administrarse. En cuanto a la raza, el Pastor Alemán, Rottweiler, Bóxer y Pit Bull entre otras presentan un elevado riesgo a padecer Parvovirus, Moquillo y Coronavirus, por lo que deben realizar la vacunación a esos perros especialmente contra estas enfermedades víricas.
- **Estado inmunológico del perro.** Si el cachorro estaba tomando la leche materna en el momento de adquirirlo, deberemos esperar unas semanas (2-3) hasta vacunarlo para evitar que los anticuerpos de la vacuna se solapen con los que le ha proporcionado la leche materna, pudiendo anular el efecto de ambas, quedando el cachorro sin protección alguna. También debe considerarse si la madre estaba correctamente vacunada y desparasitada, es decir, con un buen estado inmunitario, ya que ello será un seguro de las defensas del cachorro. Si el cachorro está correctamente alimentado (y su madre), con un peso corporal correcto, es más probable que su estado inmunológico sea óptimo y, en caso de infección vírica o bacteriana, pueda hacer frente a dichas infecciones.
- **Zona geográfica en la que habite el perro.** Determinadas áreas geográficas presentan una mayor prevalencia de enfermedades tales como Moquillo, Parvovirus,... En zonas rurales, en las que no todos los animales están vacunados adecuadamente, o en áreas en las que existen perros asilvestrados, el riesgo de enfermedades víricas es mayor, y la vacunación debe ser completa. Su veterinario habitual le recomendará el protocolo adecuado en función de cada situación concreta.
- **Hábitos del perro.** Si el cachorro convivirá con otros perros, ya sea porque se dedicará a competiciones de belleza o de Agility, los perros cazadores o los que viven en criaderos, presentan un mayor riesgo de contraer enfermedades víricas, y su vacunación debe ser estricta y completa.

Existen ciertas razas con una mayor predisposición a determinadas enfermedades. Así por ejemplo, los cachorros de Rottweiler presentan un mayor riesgo frente a enfermedades tales como la Parvovirus, Moquillo o Coronavirus, y deben vacunarse a los perros frente a ellas. Los cachorros o perros con un deficiente estado inmunológico deberán seguir unas pautas

vacunales más completas para poseer suficientes defensas. Los cachorros o perros que acudan a exposiciones o se dediquen a cría o que convivan con más perros (criaderos, residencias, etc.) deben ser especialmente inmunizados contra la Tos de las perreras. Los perros que habiten en zonas en las que el riesgo de infección por garrapata sea elevado, deberán ser vacunados contra la Enfermedad de Lyme. Quién mejor puede aconsejar la pauta vacunal de un cachorro o perro es el veterinario, ya que analizará las características individuales de cada perro y escogerá la que más le proteja.

En rasgos generales:

6 semanas	Parvovirus
8 semanas	Moquillo, Parvovirus, Leptospirosis, Hepatitis + Tos de las Perreras
12 semanas	Moquillo, Parvovirus, Leptospirosis, Hepatitis + Tos de las Perreras
5-6 meses	Moquillo, Parvovirus, Leptospirosis, Hepatitis + Rabia